

임신 27-36주

아기를 백일해로부터 보호해 주세요



백일해란?

백일해균 (*Bordetella pertussis*)
감염에 의한 급성 호흡기 질환입니다.



백일해는 어떻게 전파되나요?

- 감염된 사람이 기침이나 재채기 등을 할 때 **비말을 통해 전파**가 가능합니다.
- 증상이 있는 **감염된 사람의 침, 콧물 등이 묻은 물건을 통해서도** 간접적으로 전파가 가능해요!



백일해는 아기에게 나쁜 영향을 줄 수 있어요!

백일해 기초접종(2개월, 4개월, 6개월)을 완료하지 않은 아기가
백일해에 감염될 경우 **뇌 손상, 폐렴을
포함한 중증 합병증으로 진행될 가능성**
기초접종을 완료한 아기보다 높아요.

생후 첫 백일해 예방접종(2개월) 전까지는
엄마의 **백일해 접종을 통해 전달된 항체**가
아이를 보호할 수 있어요.



임신부가 아기를 백일해로부터 보호할 수 있어요!

산모 백일해 백신 접종은 영아를 중증 백일해로부터 보호하는 매우 효과적이고 안전한 방법이에요.

* 임신 3기 백신 접종은 신생아에게 보호 항체를 적절하게 전달하고, 영아기 백일해 발병률, 입원 및 사망률을 현저히 감소시켜요.

임신 중 백신 접종은 생후 3개월 미만 영아의 백일해 입원과 사망을 예방할 수 있어요.

* 임신 중 백신 접종은 생후 3개월 미만 영아의 백일해 입원의 최대 90.5%와 백일해 관련 사망의 95%를 예방할 수 있어요.



임신부 예방접종 시기는 언제인가요?

임신 27주~36주 사이에
백신 접종을 권장하고 있어요.
임신 중 백신 접종 시
산모에서 형성된 항체가
태아에게 전달되어
백일해 예방에 도움이 돼요.

* 임신 중 미접종 시
출산 2주 이내에
접종하는 것을 권장해요.

임신 27주~36주

임신 중에 예방접종은 어디서 맞아야 하나요?

가까운 보건소나
의료기관에 방문하셔서
의료진 상담 후에 접종하세요.



임신부 백일해 예방접종 FAQ

Q

임신 중 백일해 예방접종은 안전한가요?

A

임신 중 백일해 백신 접종은 조산이나 사산과 같은 심각한 부작용 없이, 산모와 영아 모두 안전해요.

Q

백일해 백신은 임신부들에게 무료인가요?

A

임신부 백일해 예방접종은 '국가예방접종사업'은 아니에요.

하지만, 보건복지부 '임신·출산바우처'로 의료기관과 보건소에서 모두 사용 가능해요.

(보험, 비보험 예방접종 모두 해당)

임신부 백일해 예방접종 FAQ

Q

임신 중에 백일해 예방접종을 받았는데도
아기가 예방접종을 받아야 하나요?

A

임신부가 맞으시는 접종과 무관하게
모든 영아는 적기에(생후 2, 4, 6개월)
백일해 예방접종을 맞아야 해요.



Q

가족 구성원들도 예방접종을 받아야 하나요?

A

신생아 백일해 감염을 예방하기 위해서
가장 중요한 가족 구성원은 **임신부**예요.

하지만, 1세 미만 영아의 주요 감염원이
가족인 만큼 영아를 돌보시는 아빠 등
가족 구성원에게도 권장합니다.

임신부 백일해 예방접종 FAQ

Q

임신 중에 어떤 다른 예방접종을 맞아야 하나요?

A

인플루엔자 백신도 적극 권장합니다.

<임신부 권고 예방접종>

2018년 성인예방접종 지침

구분	예방접종 종류
예방접종이 적극 권장되는 예방접종	인플루엔자, 백일해
적응증에 따라 고려하는 예방접종	B형 간염
임신 중 접종 금기인 예방접종	생백신 (MMR, 수두, 일본뇌염 생백신, 인플루엔자 생백신)