

**Q 01** 일본뇌염은 어떤 질병이며, 어느 지역에서 발생합니까?

**A** 일본뇌염은 일본뇌염 바이러스에 감염된 모기에 물려 전파되는 질환입니다.  
우리나라뿐만 아니라 동남아시아 및 서태평양 국가에서 주로 발생합니다.

**Q 02** 일본뇌염에 감염된 모기에 물린 후 얼마 후에 증상이 나타나나요?

**A** 일본뇌염에 감염된 모기에 물린 후 5~15일 이후에 증상이 나타나며, 대부분 증상이 없거나 발열 및 두통 등 가벼운 증상이 나타납니다.

**Q 03** 일본뇌염의 증상은 무엇인가요?

**A** 초기 증상은 무기력증과 발열이며 종종 두통, 복통, 메스꺼움, 구토 등을 할 수 있으며, 뇌 징후, 뇌신경 마비, 인지 및 언어장애가 나타날 수 있고 심한 경우에는 파킨슨 증상과 발작이 생길 수 있습니다.

일부에서 고열, 발작, 목 경직, 착란, 떨림, 경련, 마비 등 심각한 증상이 나타나며, 이 중 20~30%는 사망할 수 있습니다.

**Q 04** 일본뇌염은 어떻게 진단하나요?

**A** 혈액 또는 뇌척수액 검체 검사에서 확인할 수 있습니다.

**Q 05** 일본뇌염의 치료법은 무엇인가요?

**A** 일본뇌염에 대한 특이적인 치료법이 없어 증상에 따른 대증치료를 합니다.